

Pregúntele a su médico sobre la **Oferta de ahorro** para Daytrana.

Si desea obtener más información, visite nuestro sitio web:
www.Daytrana.com



Guía para padres y pacientes con TDAH



IMPORTANTE:

Daytrana es una sustancia controlada (CII) porque puede generar abuso o dependencia. Daytrana debe guardarse en un lugar seguro para evitar su robo. Vender o regalar Daytrana puede causar daño a los demás y está prohibido por la ley. Informe al médico que prescribe el medicamento si su hijo alguna vez ha abusado o sufrido dependencia del alcohol, los medicamentos recetados o las drogas.

Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción, incluidas la Guía de medicamento y la Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia.

Daytrana® y el diseño gráfico son marcas comerciales registradas de Noven Therapeutics, LLC
Para obtener información, visite www.Daytrana.com



IMPORTANTE:

Daytrana es una sustancia controlada (CII) porque puede generar abuso o dependencia. Daytrana debe guardarse en un lugar seguro para evitar su robo. Vender o regalar Daytrana puede causar daño a los demás y está prohibido por la ley. Informe al médico que prescribe el medicamento si su hijo alguna vez ha abusado o sufrido dependencia del alcohol, los medicamentos recetados o las drogas.

Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción, incluidas la Guía de medicamento y la Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia.

www.Daytrana.com



¿QUÉ ES EL TDAH?

El Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es una de las afecciones más comunes de los niños y puede continuar en la adolescencia y la edad adulta. Los síntomas incluyen:

- dificultad para mantener la concentración
- problemas para prestar atención
- incapacidad para controlar las conductas impulsivas
- hiperactividad (demasiada actividad)



¿Cómo se diagnostica el TDAH?

El TDAH no puede diagnosticarse con una sola prueba. Un pediatra o un profesional de la salud mental titulado con experiencia en trastornos mentales en la infancia puede intentar en primer lugar descartar otras razones para los síntomas. Es posible que una parte del diagnóstico incluya evaluaciones a través de una lista de verificación para calificar los síntomas de TDAH y que se pida a los padres y maestros los antecedentes del niño.

¿Qué causa el TDAH?

Los estudios sugieren que los genes de los padres constituyen uno de los factores, pero se sigue investigando para determinar otras causas posibles del TDAH, por ejemplo: exposición ambiental a toxinas, consumo de alcohol y tabaco durante el embarazo, parto prematuro, bajo peso al nacer y lesión cerebral.

¿Cómo se trata el TDAH?

Un tratamiento integral para el TDAH incluye:

- Estrategias conductuales
- Programas educativos
- Medicamentos, cuando sea necesario

La mayoría de las personas con TDAH que recibe tratamiento puede desempeñarse bien en la escuela y llevar una vida productiva.

Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción, incluidas la [Guía de medicamento](#) y la **Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia.**

Consulte al médico de su hijo sobre el TDAH

- ¿Qué tipo de medicamentos se recomienda para mi hijo?
- ¿Con qué frecuencia deberá administrarse el medicamento a mi hijo?
- ¿Cómo se administra?
- ¿Algunos días puedo interrumpir el medicamento si mi hijo no lo necesita todo el día?
- ¿Hay alternativas a los medicamentos por vía oral?
- ¿Cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos?
- ¿Cómo se maneja la pérdida de apetito o la dificultad para dormir con los diferentes medicamentos?
- ¿Cuánto dura el medicamento?
- ¿Dónde puedo obtener más información sobre el tratamiento que me recomiendan?
- ¿Qué necesito saber acerca de usar un parche en comparación con tomar una píldora?

Aproximadamente 1 de cada 10 niños en edad escolar (9.5%) ha recibido diagnóstico de TDAH.


POR QUÉ DAYTRANA® PUEDE SER LA OPCIÓN CORRECTA PARA SU HIJO CON TDAH

DAYTRANA® REMOVIBLE ES DIFERENTE

El parche removible Daytrana provee un control significativo de los síntomas del TDAH y permite flexibilidad con los horarios de los niños. Es el primero y único medicamento de efecto prolongado que no se administra por vía oral para tratar el TDAH en niños y adolescentes de 6 a 17 años. Daytrana es un parche transparente y flexible para la piel que se aplica en la cadera. El parche de Daytrana debe usarse como parte de un programa total de tratamiento para el TDAH que puede incluir asesoramiento u otros tratamientos.


- **Tiene un diseño de fácil aplicación.** Aplique el parche en la cadera por la mañana. Comienza a actuar en 2 horas. Es discreto y está diseñado para permanecer adherido. Se recomienda usar un parche diario durante un máximo de 9 horas. Los efectos pueden prolongarse durante 2 ó 3 horas después de haberlo retirado cuando se usa de 4 a 9 horas, respectivamente.
- **Ayuda a controlar los síntomas del TDAH.** Las pruebas clínicas mostraron una marcada mejora en los síntomas del TDAH. Es posible que Daytrana ayude a que su hijo **mejore la atención** y **tenga una conducta menos impulsiva e hiperactiva**.
- **Es removible para personalizar el tratamiento.** Con la indicación del médico de su hijo, el parche puede retirarse más temprano en el día si el niño tiene menos apetito o problemas para dormir por la noche. Así como los horarios y actividades de los días de la semana cambian durante el fin de semana, lo mismo puede suceder con el tiempo de uso del parche.

Tecnología de liberación transdérmica de matriz avanzada



El parche Daytrana, cuando se aplica en la cadera, libera medicamento directamente al torrente sanguíneo a través de la piel. Daytrana no se procesa en el estómago.

- No está previsto que la aplicación del parche con el estómago del niño vacío o lleno afecte la absorción de Daytrana.
- Pregunte a su médico si puede retirar el parche antes en el día si su hijo pierde el apetito o tiene problemas para dormir por la noche.
 - *Con el uso ininterrumpido del parche durante 9 horas, el 26% de los niños y adolescentes presentó cierta pérdida de apetito, y el 13% de los niños y el 6% de los adolescentes tuvieron problemas para dormir.*
- En los estudios clínicos, los efectos secundarios más frecuentes asociados con el uso del parche Daytrana fueron irritación de la piel donde se aplique el parche (enrojecimiento, bultos pequeños, comezón), poco apetito, náuseas, vómitos, dolor de estómago, pérdida de peso, tics, problemas para dormir, alteraciones en el estado de ánimo y mareos.



Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción, incluidas la [Guía de medicamento](#) y la **Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia**.

A VECES, LOS DIFERENTES DÍAS REQUIEREN RUTINAS DIFERENTES

Usted conoce mejor que nadie los horarios de todos los días de su hijo. Con el parche removible Daytrana, puede colaborar con el médico de su hijo para ajustar la duración del tratamiento y adaptarlo a los diferentes horarios de actividad y necesidades de medicamento para el TDAH del niño.

Se recomienda aplicar Daytrana en la cadera 2 horas antes de que se necesite que haga efecto y retirarlo en un máximo de 9 horas después de la aplicación.

Cobertura para todo el día Uso del parche durante 9 horas



Los beneficios del medicamento continúan durante un máximo de 3 horas más después de retirar el parche.

El parche puede usarse durante períodos más cortos en los fines de semana o en ocasiones especiales. Por ejemplo, si a su hijo le gusta despertarse tarde los sábados, puede aplicar el parche más tarde y quitárselo a la misma hora que de costumbre.

Retirar el parche más temprano puede ayudar a controlar los posibles efectos secundarios vespertinos, como la disminución del apetito o la dificultad para dormir. Es importante tener en cuenta que con el uso ininterrumpido del parche durante 9 horas, el 26% de los niños y adolescentes presentó cierta pérdida de apetito, y el 13% de los niños y el 6% de los adolescentes tuvieron problemas para dormir.

Cobertura para parte del día Uso del parche de 4 a 8 horas



Los beneficios del medicamento continúan durante un máximo de 2 horas más después de que el parche se haya usado de 4 a 6 horas y se haya retirado.

Obtenga más información en
www.Daytrana.com

Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción, incluidas la Guía de medicamento y la Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia.



Pregúntele al
médico de su
hijo sobre el
parche Daytrana.

Una opción flexible
y eficaz para tratar
el TDAH.

SE HA DEMOSTRADO LA EFICACIA DE DAYTRANA® PARA MEJORAR LA CONCENTRACIÓN Y LA CONDUCTA

- Los estudios clínicos han demostrado que Daytrana puede lograr una **marcada mejoría de la falta de atención y de los síntomas de conducta hiperactiva o impulsiva del TDAH.**
- Los estudios realizados en aulas con niños de 6 a 12 años con TDAH mostraron que los niños que usaban Daytrana no solo **intentaron resolver más** problemas de matemáticas, sino que también **resolvieron más** problemas de matemáticas **correctamente** que los niños que tomaron placebo.
- Es posible que Daytrana ayude a que su hijo mejore la atención y tenga una conducta menos impulsiva e hiperactiva. Los padres informaron una mejoría en el control de los síntomas por la mañana y la tarde.

Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción, incluidas la [Guía de medicamento](#) y la [Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia.](#)

¿QUIÉN NO DEBE USAR DAYTRANA?

El parche Daytrana no debe usarse si su hijo está muy ansioso, tenso o agitado; tiene un problema en los ojos llamado glaucoma; tiene tics (movimientos o sonidos repetidos que no se pueden controlar); tiene diagnóstico o antecedentes familiares de convulsiones o del síndrome de Tourette; ha tenido resultados anormales en la prueba de ondas cerebrales (EEG); toma un inhibidor de la monoaminoxidasa (IMAO) o ha dejado de tomar un IMAO en las últimas 2 semanas; está embarazada o amamantando; o es alérgico al metilfenidato, los adhesivos acrílicos o los adhesivos de silicona (no contiene látex).

 **Daytrana**® @
(sistema transdérmico de metilfenidato)
Customizable Control™

CONSIDERACIONES IMPORTANTES AL USAR DAYTRANA

Uso del parche Daytrana

El parche Daytrana contiene un medicamento de venta con receta estimulante del sistema nervioso central (cerebro) que se utiliza para tratar a los niños y adolescentes de 6 a 17 años con TDAH. Daytrana podría ayudar a mejorar la atención y disminuir la conducta impulsiva e hiperactiva. El parche de Daytrana debe usarse como parte de un programa total de tratamiento del TDAH, que puede incluir asesoramiento u otros tratamientos.

Información importante de seguridad

IMPORTANTE:

Daytrana es una sustancia controlada (CII) porque puede generar abuso o dependencia. Daytrana debe guardarse en un lugar seguro para evitar su robo. Vender o regalar Daytrana puede causar daño a los demás y está prohibido por la ley.

Informe al médico que prescribe el medicamento si su hijo alguna vez ha abusado o sufrido dependencia del alcohol, los medicamentos recetados o las drogas.

El parche Daytrana no debe usarse si su hijo ha recibido un diagnóstico de que está muy ansioso, tenso o agitado; tiene un problema en los ojos llamado glaucoma; tiene tics (movimientos o sonidos repetidos que no se pueden controlar); tiene un diagnóstico o antecedentes familiares del síndrome de Tourette; toma un inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO) o ha dejado de tomar un IMAO en las últimas 2 semanas; o es alérgico al metilfenidato, los adhesivos acrílicos o los adhesivos de silicona (no contiene látex).

Se han informado problemas cardíacos graves con Daytrana u otros medicamentos estimulantes, entre los que se incluyen:

- muerte súbita en las personas que tienen problemas o defectos en el corazón
- accidente cerebrovascular y ataque cardíaco en adultos
- aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca

Informe al médico si su hijo o un familiar han tenido algún problema del corazón, defectos en el corazón o aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Retire el parche Daytrana y llame al médico de inmediato si su hijo presenta algún signo de problemas cardíacos como dolor en el pecho, dificultad para respirar o desmayo mientras usa Daytrana.

Se han informado problemas mentales (psiquiátricos) graves con el parche Daytrana u otros medicamentos estimulantes, entre los que se incluyen:

- aparición o empeoramiento de la conducta agresiva, hostilidad, ira o irritabilidad
- aparición o empeoramiento de la enfermedad bipolar o manía (aumento extremo de la actividad o la conversación)
- aparición o empeoramiento de la psicosis (oír o ver cosas que no son reales, tener desconfianza o recelo, creer en cosas que no son verdaderas)
- otros cambios inusuales o extremos de la conducta o el estado de ánimo

Lea la Información Completa sobre la Prescripción y la Guía de medicamento, incluida la Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia.

Informe al médico acerca de cualquier problema mental que presenten su hijo o familiares, incluido el suicidio o la depresión, la enfermedad bipolar, la manía o la psicosis. Llame de inmediato al médico si su hijo presenta algún nuevo síntoma o problema de salud mental o si estos empeoran mientras usa el parche Daytrana.

Asegúrese de informar al médico si su hija está embarazada o amamantando.

Se han informado efectos secundarios graves por el uso del parche Daytrana, tales como convulsiones (en general, esto sucede con niños con antecedentes de convulsiones), retraso del crecimiento (peso y estatura), cambios en la visión o visión borrosa. Su hijo debe controlarse la estatura y el peso, y realizarse hemogramas mientras use el parche Daytrana, y es posible que su médico interrumpa el tratamiento si descubre algún problema durante estas revisiones.

Es posible que se presente una erupción cutánea alérgica. **Deje de usar Daytrana y consulte inmediatamente al médico si aparecen inflamación, bultos o ampollas en el lugar donde se aplique el parche o alrededor de este.**

Si usa el parche más de 9 horas en un día, o si usa más de 1 parche al mismo tiempo, habrá aplicado demasiado medicamento. Evite exponer el parche Daytrana a fuentes externas directas de calor como secadores de cabello, almohadillas térmicas, mantas eléctricas, camas de agua climatizada u otras fuentes de calor mientras use el parche. Calentar el parche puede provocar que demasiada cantidad de medicamento ingrese al organismo de su hijo y causar efectos secundarios graves.

Los efectos secundarios más comunes durante el uso del parche Daytrana incluyen problemas de la piel (enrojecimiento, pequeños bultos, comezón) donde se aplique el parche, poco apetito, náuseas, vómitos, dolor de estómago, pérdida de peso, tics, problemas para dormir, alteraciones en el estado de ánimo y mareos.

Se recomienda informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA.

Visite el sitio web <http://www.fda.gov/medwatch> o llame al 1-800-FDA-1088.

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN VISITE
WWW.DAYTRANA.COM



Consulte los recursos que se ofrecen a los cuidadores y pacientes que usan Daytrana. Estas herramientas se han diseñado para ayudarlos a tener la mejor experiencia posible.



RECUERDE PREGUNTAR AL MÉDICO DE SU HIJO SOBRE LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Se han informado efectos secundarios graves con el uso del parche Daytrana, tales como convulsiones (en general, esto sucede con niños con antecedentes de convulsiones), retraso del crecimiento (peso y estatura), cambios en la visión o visión borrosa. Es posible que se presente una erupción cutánea alérgica. **Deje de usar Daytrana y consulte de inmediato al médico si aparecen inflamación, bultos o ampollas en el lugar donde se aplique el parche o alrededor de este.**

Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción, incluidas la Guía de medicamento y la Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia.

1. Pida al médico de su hijo el kit básico para pacientes Patient Starter Kit

El **Daytrana Patient Starter Kit** incluye información importante y recursos para cuidadores, como el organizador de aplicaciones del medicamento (Medication Tracker), organizador de las aplicaciones del parche en la cadera (Hip Placement Tracker) y el adhesivo recordatorio (Reminder Cling).

2. Consulte más recursos para los cuidadores en www.Daytrana.com

El sitio web de Daytrana brinda consejos para el cuidado de la piel y otros recursos para ayudar a los padres y a los cuidadores a proporcionarles a sus hijos la mejor experiencia posible. **Visite www.Daytrana.com y consulte estas herramientas.**

3. Mire el DVD instructivo para pacientes

El DVD educativo de 17 minutos de duración ofrece información a los pacientes y cuidadores sobre las técnicas correctas para aplicar y retirar el parche Daytrana. El DVD también incluye consejos útiles para minimizar la irritación de la piel.

4. Acceso gratuito a un Profesional de la salud de **DaytranaCare™**

Los cuidadores y los pacientes que usen Daytrana pueden llamar a un profesional de la salud de Daytrana cuando lo necesiten y sin costo.

LLÁMENOS Los cuidadores y pacientes que usen Daytrana pueden llamar a la línea gratuita **1-800-475-1485** de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. (hora del Este) y los fines de semana de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., y un profesional calificado de la salud:

- le dará instrucciones detalladas sobre cómo aplicar o retirar el parche Daytrana,
- le recordará los consejos para el cuidado de la piel, y
- actuará como recurso para responderle otras preguntas sobre el parche Daytrana.



Los representantes de **DaytranaCare™** pueden ofrecer información sobre el uso adecuado del parche Daytrana. Sin embargo, consulte al médico de su hijo sobre sus inquietudes médicas individuales relacionadas con Daytrana.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE DAYTRANA

- P.** ¿Cuál es el ingrediente activo en Daytrana?
- R.** El ingrediente activo en Daytrana es el metilfenidato.
- P.** ¿Qué sucede si dejo puesto el parche Daytrana durante más de 9 horas?
- R.** Se recomienda aplicar el parche en la cadera 2 horas antes de que se necesite el efecto y dejarlo 9 horas. Cuando se lo retira, el efecto continúa por 2 ó 3 horas después de haberse utilizado durante 4 a 9 horas, respectivamente. En caso de que el niño lo usara más de 9 horas, es posible que se intensifiquen los efectos secundarios como la dificultad para dormir o falta de apetito.
- P.** ¿Por qué se debe aplicar el parche Daytrana a la cadera?
- R.** Si lo aplica en otro lugar, es posible que el medicamento que contiene el parche se absorba de manera diferente. Esta opción no se ha probado adecuadamente en estudios clínicos.
- P.** ¿Cuáles son los efectos secundarios de usar el parche Daytrana?
- R.** En los estudios clínicos, los efectos secundarios más frecuentes de Daytrana fueron irritación de la piel donde se aplique el parche (enrojecimiento, bultos pequeños, comezón), poco apetito, náuseas, vómitos, dolor de estómago, pérdida de peso, tics, problemas para dormir, alteraciones en el estado de ánimo y mareos. Con el uso de Daytrana se han informado efectos secundarios graves como convulsiones (en general, esto sucede con personas con antecedentes de convulsiones), retraso del crecimiento (peso y estatura), cambios en la visión o visión borrosa. Es posible que se presente una erupción cutánea alérgica. Deje de usar Daytrana y consulte inmediatamente al médico si aparecen inflamación, bultos o ampollas en el lugar donde se aplique el parche o alrededor de este.
- P.** ¿Qué sucede si se moja el parche Daytrana mientras mi hijo lo está usando?
- R.** El contacto con el agua al bañarse, nadar o ducharse puede afectar la adhesión del parche a la piel. Cuando se lo aplica correctamente, el parche Daytrana está diseñado para permanecer adherido y continuar liberando medicamento. Si el parche se desprende, deséchelo y puede aplicar un parche nuevo en otra zona de la misma cadera. Si aplica un nuevo parche, el tiempo total de aplicación del primer y segundo parche no debe superar 9 horas en 1 día. No use cintas adhesivas, vendas ni otros adhesivos domésticos para volver a aplicar un parche que ya no se adhiera por sí solo.



Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción, incluidas la [Guía de medicamento](#) y la **Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia.**