

Kit Daytrana® de bienvenida



**¡Incluye
ahorros!**

IMPORTANTE:

Daytrana es una sustancia controlada (CII) porque puede generar abuso o dependencia. Daytrana debe guardarse en un lugar seguro para evitar su robo. Vender o regalar Daytrana puede causar daño a los demás y está prohibido por la ley. Informe al médico que prescribe el medicamento si su hijo alguna vez ha abusado o sufrido dependencia del alcohol, los medicamentos recetados o las drogas.

 **Daytrana**® @
(sistema transdérmico de metilfenidato)
Customizable Control™

Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción que se adjunta, incluidas la **Guía de medicamento** y la **Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia**.

www.Daytrana.com

AHORRE EN LA RECETA DE DAYTRANA® DE SU HIJO

Al elegir Daytrana, usted y el médico de su hijo han tomado una decisión importante para ayudar a manejar los síntomas del TDAH del niño.

<http://www.daytrana.com/helpful-tools/daytrana-coupon.aspx>

Cuando surta sus recetas, use esta parte de la tarjeta si está asegurado o paga en efectivo.

Cuando surta sus recetas, use esta parte de la tarjeta si usa Medicaid, trabaja para el gobierno o vive en Massachusetts.

Todo lo que necesita saber acerca de cómo ayudar a que su hijo use Daytrana adecuada y eficazmente está a su disposición a través de este kit y de nuestro sitio web: www.Daytrana.com. Siga estas sugerencias para tener un buen comienzo.

- Llame al 1-866-437-0942 para activar su tarjeta.
- Lleve su tarjeta Y su receta a la farmacia.

*Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción que se adjunta, incluidas la **Guía de medicamento** y la **Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia**.*

BIENVENIDO A DAYTRANA® removible y de efecto prolongado


El parche Daytrana es el primero y único aprobado para tratar el Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños de 6 a 12 años y adolescentes de 13 a 17 años. Los estudios clínicos sobre el parche Daytrana mostraron una mejora significativa en los síntomas del TDAH, incluidas la mejoría significativa en la atención y una conducta menos impulsiva e hiperactiva.

Daytrana debe usarse como parte de un plan total de tratamiento que también podría incluir asesoramiento y otras terapias.

- **El parche Daytrana es removible para personalizar la terapia.**

Los horarios de actividad de los niños cambian continuamente, lo cual puede requerir flexibilidad para su tratamiento del TDAH. El parche removible Daytrana® ayuda a controlar los síntomas del TDAH y, a la vez, ofrece tiempos de uso adaptables para niños y adolescentes de 6 a 17 años. El parche se diseñó para uso todo el día (por ejemplo, los días de escuela) y parte

Tecnología de liberación transdérmica de matriz avanzada



del día (por ejemplo, los fines de semana). En estudios clínicos, los síntomas del TDAH en niños y adolescentes mejoraron significativamente con el uso de Daytrana. Consulte las opciones de duración del tratamiento con el médico de su hijo.

Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción que se adjunta, incluidas la **Guía de medicamento y la Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia**. Para obtener información, visite www.Daytrana.com

EL EFECTO PROLONGADO DE DAYTRANA[®] SE ADAPTA A HORARIOS EXIGENTES

Puede decidir cuándo aplicarle el parche Daytrana a su hijo y cuándo retirárselo con la orientación del médico del niño. El parche debe aplicarse 2 horas antes de que se necesite que haga efecto (incluso puede aplicarlo en la cadera de su hijo mientras duerme) y dejarse puesto durante todo el tiempo de uso recomendado de hasta 9 horas.

Días típicos de uso completo. El tiempo recomendado de uso es no más de 9 horas, pero los efectos pueden continuar hasta dos o tres horas más después de retirar el parche cuando se haya usado de 4 a 9 horas, respectivamente. Aplique el parche a las 7:00 a.m. durante 9 horas y continuará actuando hasta las 7:00 p.m. justo para completar las tareas escolares.

Días de uso parcial. Los fines de semana el niño tal vez duerma hasta más tarde, o es posible que los horarios de su familia sean diferentes. Durante estos días, puede adaptar el tratamiento a sus necesidades: aplique el parche más tarde y retírelo a la misma hora que de costumbre, o deje que lo use hasta las 9 horas recomendadas.

Cualquier día. El tratamiento puede adaptarse a sus necesidades individuales; por ejemplo, puede retirar el parche más temprano para ayudar a manejar los posibles efectos secundarios vespertinos, como la disminución del apetito o la dificultad para dormir. Con el uso ininterrumpido del parche durante 9 horas, el 26% de los niños y adolescentes experimentó cierta pérdida de apetito, y el 13% de los niños y el 6% de los adolescentes tuvieron problemas para dormir.




***Consejo:** Puede aplicar el parche mientras el niño duerme para que la liberación del medicamento comience mientras el niño se despierte.*

¿QUÉ HACE QUE DAYTRANA® REMOVIBLE SEA DIFERENTE?

Usted conoce mejor que nadie los horarios de todos los días de su hijo. A continuación se presenta un ejemplo de cómo puede ajustarse el tratamiento de su hijo, con orientación del médico del niño, para que use el parche todo el día o parte del día.

Día completo o día de semana: 9 horas de uso



Nota: Ejemplo de días

Parte del día o fin de semana: 6 horas de uso

Use el parche únicamente como le indique el médico. Nunca permita que el niño use el parche durante más de 9 horas por vez ni que use más de un parche. El uso indebido del parche puede provocar que ingrese demasiada medicación al organismo de su hijo y lo exponga al riesgo de presentar más efectos secundarios.


Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción que se adjunta, incluidas la **Guía de medicamento y la Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia**. **Para obtener información, visite www.Daytrana.com**

¿En qué se diferencia el parche Daytrana de los comprimidos para el TDAH?

Daytrana es un parche, por lo tanto, trata los síntomas del TDAH de manera diferente a los métodos tradicionales. Las diferencias son significativas porque el parche Daytrana, cuando se aplica en la cadera del niño, libera medicamento a través del torrente sanguíneo en vez de procesarlo por el estómago (como el medicamento en forma de comprimido).

- No está previsto que la aplicación del parche con el estómago del niño vacío o lleno, afecte la absorción de Daytrana.
- La potencia de la dosis puede ser diferente a la de los medicamentos en forma de comprimido.
- El parche Daytrana puede retirarse antes de las 9 horas de uso recomendado, si es necesario.
- El enrojecimiento o la comezón en la piel son comunes con el uso del parche Daytrana. En la mayoría de los casos, la irritación de la piel desaparece en 24 horas.

Consejo: Mire el DVD instructivo para pacientes o visite www.Daytrana.com para obtener más información sobre los efectos previstos con el uso del parche Daytrana.



CONTROL PROLONGADO DE LOS SÍNTOMAS DEL TDAH CON DAYTRANA®

Se ha demostrado la eficacia del parche removible Daytrana® para mejorar la concentración y la conducta.

- Se ha demostrado en estudios clínicos que Daytrana puede lograr una significativa mejoría de los síntomas de falta de atención y conducta hiperactiva o impulsiva del TDAH.
- Los estudios realizados en aulas con niños de 6 a 12 años con TDAH mostraron que los niños que tomaban Daytrana no solo **intentaron resolver más** problemas de matemáticas, sino que también **resolvieron más** problemas de matemáticas **correctamente** que los niños que tomaban placebo.
- En los estudios clínicos, los efectos secundarios más comunes de Daytrana fueron: irritación de la piel donde se aplica el parche (enrojecimiento, bultos pequeños, comezón), poco apetito, náuseas, vómitos, dolor de estómago, pérdida de peso, tics, problemas para dormir, alteraciones en el estado de ánimo y mareos. Con el uso de Daytrana se han informado efectos secundarios graves, tales como convulsiones (en general, esto sucede en las personas con antecedentes de convulsiones), retraso del crecimiento (peso y estatura), cambios en la visión o visión borrosa. Es posible que provoque erupción cutánea. **Deje de usar Daytrana y consulte de inmediato al médico si aparece inflamación, bultos o ampollas en el lugar donde se aplica el parche o alrededor de este.**



Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción que se adjunta, incluidas la **Guía de medicamento y la Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia**. **Para obtener información, visite www.Daytrana.com**

Qué puede esperar de Daytrana en el primer mes.

Es común experimentar algunos efectos secundarios al comenzar a usar medicamentos para el TDAH. Comunicarle al médico los cambios en la conducta de su hijo o los síntomas del TDAH que observe ayudará a determinar la combinación correcta para satisfacer las necesidades del niño.

- Es posible que el médico de su hijo ajuste la dosis o el tiempo de uso de Daytrana para mejorar los resultados o ayudar a manejar los efectos secundarios. Cuando comienzan a usarse medicamentos para el TDAH, es común que se ajuste la dosis hasta lograr la correcta para el niño.
- El parche Daytrana no debe usarse si su hijo está muy ansioso, tenso o agitado; tiene un problema en los ojos llamado glaucoma; tiene tics (movimientos o sonidos repetidos que no se pueden controlar); tiene diagnóstico o antecedentes familiares de convulsiones o del síndrome de Tourette; ha tenido resultados anormales en la prueba de ondas cerebrales (EEG); toma un inhibidor de la monoaminoxidasa (IMAO) o ha dejado de tomar un IMAO en las últimas 2 semanas; está embarazada o amamantando; o es alérgico al metilfenidato, los adhesivos acrílicos o los adhesivos de silicona (no contiene látex).




Daytrana®: dosis y tiempo de uso

Se recomienda una dosis inicial de 10 mg.

Es posible que el médico de su hijo ajuste la dosis o el tiempo de uso de Daytrana para mejorar los resultados o ayudar a manejar los posibles efectos secundarios. Cuando comienzan a usarse medicamentos para el TDAH, es común que se ajuste la dosis inicial recomendada de 10 mg hasta lograr la dosis correcta para el niño. Se recomienda usar el parche hasta nueve horas; pero se puede retirar antes.

Asegúrese de consultar al médico del niño sobre cómo la dosis correcta puede ayudar a proporcionar a su hijo la mejor experiencia posible con el parche Daytrana.

Con la indicación del médico de su hijo, el parche puede retirarse más temprano en el día si el niño tiene menos apetito o problemas para dormir por la noche. Con el uso ininterrumpido del parche durante 9 horas, el 26% de los niños y adolescentes experimentó cierta pérdida de apetito, y el 13% de los niños y el 6% de los adolescentes tuvieron problemas para dormir.



Nota: Las imágenes no corresponden al tamaño real del parche para las 4 potencias de la dosis.

Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción que se adjunta, incluidas la **Guía de medicamento y la Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia**. Para obtener información, visite www.Daytrana.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

USO DEL PARCHÉ DAYTRANA

El parche Daytrana contiene un medicamento de venta con receta estimulante del sistema nervioso central (cerebro) que se utiliza para tratar a los niños y adolescentes de 6 a 17 años con TDAH. Daytrana podría ayudar a mejorar la atención y disminuir la conducta impulsiva e hiperactiva. El parche de Daytrana debe usarse como parte de un programa total de tratamiento del TDAH, que puede incluir asesoramiento u otros tratamientos.

Información importante de seguridad

IMPORTANTE:

Daytrana es una sustancia controlada (CII) porque puede generar abuso o dependencia. Daytrana debe guardarse en un lugar seguro para evitar su robo. Vender o regalar Daytrana puede causar daño a los demás y está prohibido por la ley.

Informe al médico que prescribe el medicamento si su hijo alguna vez ha abusado o sufrido dependencia del alcohol, los medicamentos recetados o las drogas.

El parche Daytrana no debe usarse si su hijo ha recibido un diagnóstico de que está muy ansioso, tenso o agitado; tiene un problema en los ojos llamado glaucoma; tiene tics (movimientos o sonidos repetidos que no se pueden controlar); tiene un diagnóstico o antecedentes familiares del síndrome de Tourette; toma un inhibidor de la monoaminooxidasa (IMAO) o ha dejado de tomar un IMAO en las últimas 2 semanas; o es alérgico al metilfenidato, los adhesivos acrílicos o los adhesivos de silicona (no contiene látex).

Se han informado problemas cardíacos graves con Daytrana u otros medicamentos estimulantes, entre los que se incluyen:

- muerte súbita en las personas que tienen problemas o defectos en el corazón
- accidente cerebrovascular y ataque cardíaco en adultos
- aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca

Informe al médico si su hijo o un familiar han tenido algún problema del corazón, defectos en el corazón o aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Retire el parche Daytrana y llame al médico de inmediato si su hijo presenta algún signo de problemas cardíacos como dolor en el pecho, dificultad para respirar o desmayo mientras usa Daytrana.

Se han informado problemas mentales (psiquiátricos) graves con el parche Daytrana u otros medicamentos estimulantes, entre los que se incluyen:

- aparición o empeoramiento de la conducta agresiva, hostilidad, ira o irritabilidad
- aparición o empeoramiento de la enfermedad bipolar o manía (aumento extremo de la actividad o la conversación)
- aparición o empeoramiento de la psicosis (oír o ver cosas que no son reales, tener desconfianza o recelo, creer en cosas que no son verdaderas)
- otros cambios inusuales o extremos de la conducta o el estado de ánimo

Informe al médico acerca de cualquier problema mental que presenten su hijo o familiares, incluido el suicidio o la depresión, la enfermedad bipolar, la manía o la psicosis. Llame de inmediato al médico si su hijo presenta algún nuevo síntoma o problema de salud mental o si estos empeoran mientras usa el parche Daytrana.

Asegúrese de informar al médico si su hija está embarazada o amamantando.

Se han informado efectos secundarios graves por el uso del parche Daytrana, tales como convulsiones (en general, esto sucede con niños con antecedentes de convulsiones), retraso del crecimiento (peso y estatura), cambios en la visión o visión borrosa. Su hijo debe controlarse la estatura y el peso, y realizarse hemogramas mientras use el parche Daytrana, y es posible que su médico interrumpa el tratamiento si descubre algún problema durante estas revisiones.

Es posible que se presente una erupción cutánea alérgica. **Deje de usar Daytrana y consulte inmediatamente al médico si aparecen inflamación, bultos o ampollas en el lugar donde se aplique el parche o alrededor de este.**

Si usa el parche más de 9 horas en un día, o si usa más de 1 parche al mismo tiempo, habrá aplicado demasiado medicamento. Evite exponer el parche Daytrana a fuentes externas directas de calor como secadores de cabello, almohadillas térmicas, mantas eléctricas, camas de agua climatizada u otras fuentes de calor mientras use el parche. Calentar el parche puede provocar que demasiada cantidad de medicamento ingrese al organismo de su hijo y causar efectos secundarios graves.

Los efectos secundarios más comunes durante el uso del parche Daytrana incluyen problemas de la piel (enrojecimiento, pequeños bultos, comezón) donde se aplique el parche, poco apetito, náuseas, vómitos, dolor de estómago, pérdida de peso, tics, problemas para dormir, alteraciones en el estado de ánimo y mareos.

Lea la Guía de medicamento y la Información Completa sobre la Prescripción, incluida la Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia.

Se recomienda informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA.


Visite el sitio web <http://www.fda.gov/medwatch> o llame al 1-800-FDA-1088.

CÓMO USAR EL PARCHE DAYTRANA®

La aplicación del parche Daytrana es tan rápida como retirar, colocar y presionar. Siga las instrucciones que aparecen a continuación.

1. DÓNDE APLICAR DAYTRANA

- Aplique el parche en la cadera una vez al día. (Evite aplicarlo en la cintura, ya que es posible que la ropa roce el parche y lo despegue).
- Debe alternar la cadera en la que aplique el parche todos los días para reducir la posible irritación. Además, aplique el parche en un lugar distinto de la cadera del niño. Por ejemplo, si se usa el parche en la cadera izquierda el día 1, aplíquelo en la cadera derecha el día 2, en la cadera izquierda el día 3 y así sucesivamente.
- Preste atención al enrojecimiento, los pequeños bultos o la comezón en el lugar donde se aplicará el parche. No aplique el parche sobre la piel irritada.



Consejo: Aplique el parche en una cadera los días impares y en la otra los días pares. (Recuerde, en los meses con 31 días, tendrá que cambiar el lado de la cadera el primer día del mes siguiente). Intente no usar el mismo lugar de aplicación en cada cadera durante varios días. Casi al final de este kit encontrará un cuadro útil que puede completar para hacer un seguimiento de qué cadera usar cada día.



2. ANTES DE APLICAR DAYTRANA

- Asegúrese de que el parche no tenga defectos ni esté cortado o dañado, de ninguna manera se separe con facilidad de la lámina protectora y no se haya guardado en el refrigerador o el congelador. Deseche los parches dañados.
- Limpie y seque la piel. Asegúrese de que el lugar de aplicación no presente cortes ni irritación. La piel no debe tener polvo, aceite ni loción.




3. CÓMO APLICAR DAYTRANA

- Cuando esté listo para aplicar el parche Daytrana, use tijeras para recortar el envase individual de protección cuidadosamente por la línea de puntos. No use un parche Daytrana que se haya cortado o dañado accidentalmente.
- Aplique el parche inmediatamente después de retirarlo del envase individual de protección.
- Sostenga el parche con la lámina protectora (parte posterior del parche) de frente a usted. **La palabra Daytrana aparecerá al revés.**



CÓMO USAR EL PARCHÉ DAYTRANA® (CONT.)

- **Con cuidado**, doble el parche por la **línea apenas visible y retire** lentamente la mitad de la lámina protectora para dejar expuesta la superficie adhesiva del parche. Evite tocar la parte adhesiva del parche.
- Coloque la parte adhesiva del parche sobre la cadera del niño y presiónelo con firmeza para alizarlo y fijarlo.
- Con cuidado, doble la otra mitad del parche y retire lentamente la otra parte de la lámina protectora.
- Use la palma de la mano para presionar todo el parche firmemente durante por lo menos 30 segundos. Esto asegura la buena adhesión del parche a la piel. Alise los bordes del parche para asegurar que esté firme y bien puesto.
- Lávese las manos de inmediato después de aplicar el parche.
- Si el parche se desprende, deséchelo y aplique un nuevo parche en otro lugar de la misma cadera. El tiempo total de uso del parche en un día es 9 horas, independientemente del número de parches que haya usado.



Tenga en cuenta: No debe volver a aplicar el parche con vendas, cinta adhesiva ni otros adhesivos domésticos. Tampoco use secadores de cabello, almohadillas térmicas, mantas eléctricas ni otras fuentes de calor directamente sobre el parche.

4. CÓMO QUITAR Y DESECHAR EL PARCHÉ DAYTRANA

- Al quitar el parche, hágalo lentamente. Si es necesario, para facilitar la extracción, puede aplicar con cuidado un producto a base de aceite (vaselina, aceite de oliva o aceite mineral) en los bordes del parche y suavemente tratar de que penetre por debajo de los bordes del parche.
- Doble por la mitad el parche Daytrana usado para que se peguen los lados adhesivos. **Arroje el parche usado por el inodoro o deséchelo de inmediato en un recipiente con tapa. No lo arroje en el inodoro si tiene un tanque séptico.**
- Frote suavemente la zona de aplicación del parche con aceite o loción para eliminar todo resto de adhesivo de la piel que haya quedado después de retirar el parche.
- Lávese las manos de inmediato después de manipular el parche.
- No arroje por el inodoro los envases individuales de protección ni las láminas protectoras. Estos elementos deben desecharse apropiadamente en un recipiente con tapa.

Consejo: En la parte posterior de este kit encontrará un cuadro para ayudarle a realizar un seguimiento de cuándo se aplicó el parche Daytrana y cuándo se lo retiró. Use la herramienta Organizador de aplicaciones del medicamento como recurso cuando comience una receta de Daytrana.



Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción que se adjunta, incluidas la **Guía de medicamento y la Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia**. **Para obtener información, visite www.Daytrana.com**


CONSEJOS SOBRE EL CUIDADO DE LA PIEL PARA USAR DAYTRANA®

Es posible que usted y su hijo observen un leve enrojecimiento de la piel o comezón en el lugar de aplicación del parche debido a que Daytrana es un parche que se adhiere a la piel. Esto es común cuando se usa Daytrana y, en la mayoría de los casos, la irritación de la piel desaparece en un plazo de 24 horas.

Siga el abecé del cuidado de la piel para que su experiencia con el parche Daytrana sea la mejor.

Alternar

- Use Daytrana según las indicaciones del médico y recuerde **alternar la cadera** en la que se usa el parche cada día para minimizar los posibles efectos secundarios en la piel. Además, aplique el parche en un lugar distinto de la cadera del niño.



Ejemplo de aplicaciones en diferentes lugares y alternancia de caderas. Intente no usar el mismo lugar de aplicación en cada cadera durante varios días.

Bien cuidadoso

- Despegue siempre con cuidado el parche de la piel del niño. Si es necesario, use un producto a base de aceite, como la vaselina, para eliminar el residuo adhesivo de la piel. Se recomienda usar jabones suaves. Es mejor que el niño se bañe (en bañera o ducha) por la **noche**. No use un humectante **antes de** aplicar el parche por la mañana.

Secar, limpiar, aplicar

- Antes de aplicar un nuevo parche Daytrana, la piel debe estar limpia y seca, SIN polvo, aceite, loción, cortes ni irritación. No lave con jabón ni aplique cremas o lociones inmediatamente antes de aplicar el parche. El enrojecimiento es común y puede no ser un motivo para interrumpir el tratamiento.

Es posible presentar una reacción alérgica al Daytrana. Informe al médico de su hijo toda erupción de la piel que aparezca en las zonas donde se aplicó el parche Daytrana. El médico de su hijo puede decidir si la erupción es irritación o es una reacción alérgica de la piel. Los pacientes que tengan reacciones alérgicas de la piel al Daytrana pueden desarrollar alergia a todos los medicamentos que contengan metilfenidato, incluidos los comprimidos.

Deje de usar el parche y comuníquese con su médico si el enrojecimiento es acompañado por una reacción más intensa de la piel que no mejora significativamente antes de las 48 horas o que se extiende más allá del lugar de aplicación del parche.

***CONSEJO:** Si el enrojecimiento persiste pero no está acompañado por una reacción más intensa de la piel, pregúntele al médico de su hijo sobre posibles tratamientos.*



Daytrana, como parte de un programa integral de tratamiento para el TDAH, puede ayudar a su hijo a concentrarse durante el día.

Es posible que un programa de tratamiento para el TDAH también incluya, entre otras opciones, modificación de conductas, formación de un equipo de apoyo, desarrollo de capacidades organizativas y más. El médico de su hijo tal vez le recomiende que reciba asesoramiento u otra clase de terapia.

***CONSEJO:** Al iniciar una rutina, resulta útil tener un recordatorio. En la parte posterior de este kit encontrará un adhesivo recordatorio que puede colocar en el espejo del baño o del dormitorio.*



RECURSOS PARA EL TDAH

Esta lista de sitios web y enlaces externos útiles se ha compilado para tener acceso a información relacionada con el TDAH.

- **Children and Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder**
www.chadd.org
- **ADD Resources**
www.addresources.org
- **ADDvance**
www.addvance.com
- **American Academy of Child and Adolescent Psychiatry**
www.aacap.org
- **American Academy of Pediatrics**
www.healthychildren.org
- **Attention Deficit Disorder Association**
www.add.org
- **National Resource Center on ADHD**
www.help4adhd.org
- **ADDitude Magazine**
www.additudemag.com

*Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción que se adjunta, incluidas la **Guía de medicamento y la Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia.** Para obtener información, visite www.Daytrana.com*

CÓMO HABLAR CON SU HIJO


Antes de que su hijo comience a usar Daytrana, hablele sobre su nuevo tratamiento para el TDAH.

Si esta es la primera vez que su hijo usa un medicamento para el TDAH, sugerimos que lo prepare para que sepa qué esperar. Si su hijo toma actualmente un comprimido para el TDAH, quizás se pregunte por qué ha cambiado el tratamiento y cuáles son los posibles beneficios y diferencias del parche.

Recordatorio importante:

Daytrana es una sustancia controlada (CII) porque puede generar abuso o dependencia. Daytrana debe guardarse en un lugar seguro para evitar su robo. Vender o regalar Daytrana puede causar daño a los demás y está prohibido por la ley.

Puede llamar a **DaytranaCare™** al 1-800-475-1485 si tiene alguna pregunta.



Preguntas y respuestas sobre Daytrana

P. ¿Cuál es el ingrediente activo del parche Daytrana?

R. El ingrediente activo en Daytrana es el metilfenidato.

P. ¿Por qué se debe aplicar el parche Daytrana en la cadera?

R. Si lo aplica en otro lugar, es posible que el medicamento que contiene el parche se absorba de manera diferente. Esto no se ha evaluado adecuadamente en estudios clínicos.

P. ¿Si un día retiro antes el parche Daytrana de mi hijo, puedo volver a usarlo otro día?

R. No. Cada vez que retire el parche Daytrana, debe desecharlo adecuadamente (consulte las instrucciones para aplicar, retirar y desechar Daytrana).

P. ¿Qué sucede si dejo puesto el parche Daytrana durante más de 9 horas?


R. Se recomienda aplicar el parche en la cadera 2 horas antes de que se necesite el efecto y que se lo use durante 9 horas como máximo. Cuando se lo retira, el efecto continúa durante 2 ó 3 horas más después de haberse utilizado de 4 a 9 horas como máximo, respectivamente. Si su hijo lo usa más de 9 horas, es posible que se intensifiquen los efectos secundarios, tales como la dificultad para dormir o falta de apetito. Comuníquese con el médico de su hijo si estos efectos secundarios u otros le causan molestias.

P. ¿Qué sucede si se moja el parche Daytrana mientras mi hijo lo está usando?

R. Cuando se lo aplica correctamente, el parche Daytrana está diseñado para permanecer adherido y continuar liberando medicamento incluso si está expuesto al agua.

Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción que se adjunta, incluidas la **Guía de medicamento y la Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia**. **Para obtener información, visite www.Daytrana.com**

Apoyo gratuito para los usuarios de Daytrana



Aproveche *DaytranaCare*: un servicio gratuito que ofrece apoyo personalizado para los pacientes y sus cuidadores.

LLÁMENOS de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. hora del Este para obtener respuestas a sus preguntas.

1-800-475-1485

Los calificados profesionales de atención médica de *DaytranaCare*:

- le darán instrucciones detalladas sobre cómo aplicar o retirar el parche Daytrana,
- le recordarán los consejos para el cuidado de la piel, y
- actuarán como recurso para responderle otras preguntas sobre el parche Daytrana.

Los representantes de *DaytranaCare* pueden ofrecer información sobre el uso adecuado de Daytrana. Sin embargo, consulte al médico de su hijo sobre sus inquietudes médicas individuales relacionadas con Daytrana.

En este sobre encontrará valiosas herramientas

- Información Completa sobre la Prescripción, incluida una Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia
- Adhesivo recordatorio
- Organizador de aplicaciones del medicamento
- Una hoja adhesiva para ayudarle a recordar que debe alternar el lugar de aplicación del parche en la cadera todos los días

Llame a **DaytranaCare™** al 1-800-475-1485 si tiene alguna pregunta o desea hacer un comentario sobre Daytrana.

Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción que se adjunta, incluidas la **Guía de medicamento y la Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia.**

www.Daytrana.com





IMPORTANTE:

Daytrana es una sustancia controlada (CII) porque puede generar abuso o dependencia. Daytrana debe guardarse en un lugar seguro para evitar su robo. Vender o regalar Daytrana puede causar daño a los demás y está prohibido por la ley. Informe al médico que prescribe el medicamento si su hijo alguna vez ha abusado o sufrido dependencia del alcohol, los medicamentos recetados o las drogas.

Lea la Información importante de seguridad y la Información Completa sobre la Prescripción que se adjunta, incluidas la **Guía de medicamento** y la **Advertencia del recuadro sobre el abuso y la dependencia**.

Para obtener información, visite **www.Daytrana.com**

Se recomienda informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Visite el sitio web <http://www.fda.gov/medwatch> o llame al 1-800-FDA-1088.

NOVEN
THERAPEUTICS, LLC

Daytrana[®] y el diseño gráfico son marcas comerciales registradas de Noven Therapeutics, LLC.

Si desea obtener más información visite el sitio web www.Daytrana.com o llame al 1-877-567-7857

©2011 Noven Therapeutics, LLC. Todos los derechos reservados.

Impreso en EE. UU. DAY-1025 08/11